

RED OXİ

DIŞ PARAZİT VE SOLUNGAÇ PARAZİTİ TEDAVİ EDİCİ VE ÖNLEYİCİ

AÇIKLAMA :

RED OXİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DIŞ PARAZİT VE SOLUNGAÇ PARAZİTİNDE KULLANILAN GÜÇLÜ OKSİDATİF ÖZELLİĞİ OLAN ETKİLİ BİR PARAZİT İLACIDIR.

UYGULAMA ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER:

- 1) UYGULAMA ÖNCESİ MUTLAKA ELDİVEN TAKILMALI VE GÖZ İLE TEMASI ENGELLENMELİDİR.
- 2) GÜÇLÜ BİR HAVALANDIRMA OLMALIDIR.
- 3) UV VE CARBON FİLTREYİ KAPATIN.
- 4) UYGULAMA ÖNCESİNDE AKVARYUMDA KARADES , SALYANGOZ V.B. CANLI VAR İSE ALINMALIDIR.

KULLANIMI:

TANK LT	DÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK	BANYO
50 LT	5ML	10ML	15ML	50ML
100 LT	10ML	20ML	30ML	100ML
300 LT	30ML	60ML	90ML	300ML

DÜŞÜK DOZ : HASSAS TÜRLER İÇİN GÜVENLİ BAŞLANGIÇ

ORTA DOZ : STANDART TEDAVİ 3 VEYA 4 SAATLİK UYGULAMA

YÜKSEK DOZ : DAHA DİRENÇLİ PARAZİTLERDE

BANYO DOZU : ANA TANKTAN AYRI BİR TANKATA HAZIRLANIR. 20 – 30 DAKİKA ARASI UYGULAMA YAPILIR.

UYGULAMASI:

YUKARIDAKİ TABLOYA GÖRE ÇÖZELTİ BİR KAPTA HAZIRLANIR. KARIŞIMIN TAM ANLAMINI İLE KARIŞTIĞINDAN EMİN OLDUKTAN SONRA AKVARYUMA YAVAŞ YAVAŞ DÖKÜLÜR.

UYGULAMA SONRASI BALIKARDA STRES İBARESİ VEYA HAREKETLERİNDE FARKLILIK GÖZLEMLENİR İSE AQUA BLOCK İLE NÖTRİZE EDİNİZ.

ÖNEMLİ NOTLAR:

TÜR HASSASİYETİ OLABİLİR (YAYIN , KEDİ VE LABİRENT BALIKLARINDA DİKKATLİ KULLANILMALIDIR.)

BİTKİLİ TANK KULLANIMINDA DÜŞÜK DOZ İLE BAŞLAYINIZ.

SAKLAMA KOŞULLARI:

GÜNEŞ GÖRMEYEN ORTAMDA VE SERİN YERDE MUHAFAZA EDİDİNİZ.

ÇOCUKLARINIZIN VE EVCİL HAYVANLARINIZIN ERIŞEMEYECEĞİ YERLERDE MUHAFAZA EDİNİZ.

UYGULAMA SONRASI:

- 1) AKVARYUM SUYU VEYA BANYO SUYU PEMBE VEYA MOR OLMALIDIR. KAHVE RENGİYE 1 SAAT İÇİNDE DÖNER İSE ORGANİK YÜK FAZLADIR. %50 DİP ÇEKİMİ YAPILMALIDIR. 24 SAAT SONRA İLAÇ TEKRAR KULLANILMA BİLİR.
- 2) BALIKARDA STRES İBARESİ VEYA HAREKETLERİNDE FARKLILIK GÖZLEMLENİR İSE AQUA BLOCK İLE NÖTRİZE EDİP. %50 DİP ÇEKİMİ YAPILMALIDIR.
- 3) UYGULAMA ESNASINDA AKVARYUMDA KARİDES , SALYANGOZ V.B. CANLI VAR İSE ALINMALIDIR.
- 4) SONUÇ ALINMADIĞI DÜŞÜNÜLÜR İSE 24 SAAT SONRA TEKRAR UYGULAMA YAPABİLİRSİNİZ.

ÖNEMLİ NOT:

SADECE TATLI SU AKVARYUMLARINDA KULLANILIR. ACI SU VE DENİZ AKVARYUMLARINDA KULLANILMAZ.

OMURGASIZ CANLILAR İÇİN TOXİT BİR MADDEDİR.

ETKİ ALANLARI:

DIŞ PARAZİTLER (COSTİA,TRİCHODİNA,CİHİDONELLA,GRODACTYLUS)

MANTAR ENFEKSİYONLARI (SAPIOLEGNİA)

BAKTERİYEL YÜK AZALTMA (YÜZEYSEL ENFEKSİYONLARA DESTEK)

ORGANİK YÜK KONTROLÜ (SUDAKİ ORGANİK MADDE OKSİDASYONU)

EKİPMAN DEZENFEKTE (CİMBİZ, MAKAS, KOVA, TANK, KEPÇE V.B. EKİPMALARIN DEZENFEKTE EDİLMESİ İÇİN KULLANILIR.)

BRT HARD EDİTİON VE PRADATOR FARM TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.

MADE İN TÜRKİYE